



PRESCRIZIONE DI FARMACI IN RELAZIONE AD INTERVENTO CHIRURGICO OFTALMICO

LEVOFLOXACINA 500 mg compresse, 1 scatola

Assumere una compressa:

- La sera precedente l'intervento
- La sera dell'intervento
- La sera dei tre giorni successivi all'intervento.

Per una migliore tolleranza, le compresse possono essere assunte a stomaco pieno.

BETABIOPTAL collirio, oppure NETILDEX collirio, oppure TOBRADEX collirio

EXOCIN collirio, oppure OKACIN collirio, oppure OFTAQUIX collirio

Il giorno precedente l'intervento instillare una goccia di entrambi i colliri nell'occhio da operare alle ore 9-12-17-22.

Nei giorni successivi all'intervento, i colliri devono essere instillati secondo il seguente schema:

- 4 volte al giorno per la prima settimana (ore 8-12-17-22)
- 3 volte al giorno per la seconda settimana (ore 8-15-22)
- 2 volte al giorno per la terza settimana (ore 8-20)
- 1 volta al giorno per la quarta settimana (ore 8)

Note:

- *i due preparati possono essere instillati a distanza di cinque minuti l'uno dall'altro*
- *sospendere l'instillazione ed avvertire il medico in caso di effetti collaterali (ad esempio, forte arrossamento dell'occhio)*